

# SUPREP® BOWEL PREP KIT

(كبريتات الصوديوم وكبريتات البوتاسيوم وكبريتات المغنيسيوم)  
محلول يؤخذ عن طريق الفم

البالغين

(17.5 جم/3.13 جم/1.6 جم) لكل 6 أونصات سائلة



## معلومات خاصة بمقدم الرعاية الصحية

الاسم:

العنوان:

المدينة:

الولاية:

الرمز البريدي:

الهاتف:

الفاكس:

مجموعة تحضير الأمعاء SUPREP هي جرعة مُقسّمة (على يومين). من الضروري تناول كلا الزجاجتين التي تحتوي كل منهما على 6 أونصات سائلة وذلك من أجل تحضير كامل.

الجرعة الأولى: ابدأ الخطوة 1 الساعة \_\_\_\_\_ مساءً في الليلة السابقة للتنظير وتابع الخطوات وفقاً لما هو موضح بالأسفل:


يجب عليك أن تكمل الخطوات من 1 إلى 4 باستخدام زجاجة واحدة (1) تحتوي على 6 أونصات سائلة قبل الذهاب إلى الفراش:

أضف ماء الشرب  
البارد إلى أن يصل إلى  
خط 16 أونصة سائلة  
الموجود على الكوب  
واخلط المزيج.  
**ملاحظة:** خفف  
تركيز المحلول قبل  
الاستخدام وفقاً  
للتعليمات.



الخطوة 2

أفرغ زجاجة واحدة (1)  
من سائل SUPREP  
(6 أونصات سائلة) في  
كوب الخلط.



الخطوة 1

يجب عليك شرب  
كوبين (2) آخرين من  
الماء حجم كل منهما  
16 أونصة سائلة خلال  
الساعة (1) التالية.



الخطوة 4

اشرب كل السائل  
الموجود في  
الكوب.



الخطوة 3

الجرعة الثانية: ابدأ الخطوة 1 في الساعة \_\_\_\_\_ صباحاً في صباح يوم التنظير واتبع الخطوات وفقاً لما هو موضح بالأعلى:

ولهذه الجرعة، كرر الخطوات من 1 إلى 4 المبينة بالأعلى باستخدام الزجاجة الأخرى التي تحتوي على 6 أونصات سائلة.  
**ملاحظة:** يجب عليك الانتهاء من شرب آخر كوب ماء قبل ساعتين على الأقل، أو حسب التعليمات، من الخضوع لتنظير القولون.

(يرجى مراجعة الصفحة الأخرى للاطلاع على تعليمات إضافية.)

## تعليمات خاصة من مُقدِّم الرعاية الصحية

### في اليوم السابق لإجراء التنظير...

#### الأشياء التي يمكنك فعلها:

- يمكنك تناول إفطار خفيف أو شرب سوائل صافية فقط؛ ويُرجى عدم تناول العشاء.

#### الأشياء التي لا يمكنك فعلها:

- لا تشرب الحليب.
- لا تأكل أو تشرب أي شيء لونه أحمر أو بنفسجي.
- لا تشرب مشروبات كحولية.

#### يمكنك شرب أي من السوائل التالية:

- الماء.
- عصير الفواكه المُصفى (دون لب)، بما في ذلك عصير التفاح أو البرتقال أو العنب الأبيض أو التوت البري الأبيض.
- عصير الليمون أو الليمونادة.
- القهوة أو الشاي (لا تستخدم أي مبييض مصنوع من الألبان أو من غير الألبان).
- حساء الدجاج.
- حلوى الهلام دون إضافة فاكهة أو طبقات للزينة (لا تستخدم أي شيء لونه أحمر أو بنفسجي).

#### ملاحظة:

- مجموعة تحضير الأمعاء SUPREP هي مُلين تناضحي يُستخدم لتنظيف القولون كإجراء تحضيرى لتنظير القولون في المرضى البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر.
- تأكد من إخبار طبيبك بجميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية أو دون وصفة طبية والفيتامينات والمُكمّلات العشبية. قد تؤثر مجموعة تحضير الأمعاء SUPREP على طريقة عمل الأدوية الأخرى.
- قد لا تُمتص بشكل ملائم الأدوية التي يجري تناولها عن طريق الفم في حال تناولها خلال ساعة واحدة قبل بدء تناول كل جرعة من مجموعة تحضير الأمعاء SUPREP.
- في حال تناول المضادات الحيوية تيتراسيكلين أو فلوروكينولون أو الحديد أو الديجوكسين أو الكلوربرومازين أو البينيبيلامين، يجب تناول تلك الأدوية قبل ساعتين على الأقل من تناول مجموعة تحضير الأمعاء SUPREP أو بعد ما لا يقل عن 6 ساعات من تناول مجموعة التحضير.
- أكثر الأعراض الجانبية شيوعًا لدى البالغين (أقل من 2 بالمائة) بعد تناول مجموعة تحضير الأمعاء SUPREP هي إحساس عام بعدم الارتياح وانتفاخ البطن والشعور بألم في البطن والإحساس بالغثيان والقيء.
- إذا كان لديك أي أسئلة حول تناول مجموعة تحضير الأمعاء SUPREP، اتصل بطبيبك.

## الإجراء الذي ستخضع له

### الوقت/التاريخ:

### المكان:

إذا كان لديك أي أسئلة، يُرجى الاتصال بمُقدِّم الرعاية الصحية المتابع لحالتك على:

لمعرفة المزيد حول هذا المُنتج، يرجى الاتصال على الرقم

1-800-874-6756 أو زيارة الموقع الإلكتروني [www.suprekit.com](http://www.suprekit.com)

(يُرجى مراجعة الصفحة الأخرى للاطلاع على تعليمات إضافية.)

يُرجى قراءة المعلومات الدوائية ودليل الأدوية المُرفقين مع المجموعة.