

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЩИКЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Ф.И.О.:
Адрес:
Город:
Штат:
Индекс:
Телефон:
Факс:

SUPREP® BOWEL PREP KIT

(сульфат натрия, сульфат калия и сульфат магния)

Раствор для приема внутрь

Для взрослых

(17,5 г / 3,13 г / 1,6 г) на 6 унций



Набор для подготовки кишечника SUPREP принимается в режиме дробной дозы (2 дня). Для полной подготовки нужны обе бутылки объемом 6 унций.

ПЕРВАЯ ДОЗА: Начать шаг 1 в _____ вечера накануне процедуры и продолжить, как показано ниже:


Необходимо выполнить шаги с 1 по 4, используя одну (1) бутылку объемом 6 унций перед сном:

ШАГ 1



Вылить **ОДНУ** (1) бутылку объемом 6 унций жидкости SUPREP в емкость для смешивания.

ШАГ 2



Добавить прохладную питьевую воду до отметки 16 унций на контейнере и перемешать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Развести концентрат раствора перед использованием согласно инструкции.

ШАГ 3



Выпить **ВСЮ** жидкость в емкости.

ШАГ 4



Необходимо выпить еще две (2) емкости с водой объемом 16 унций в течение следующего часа

ВТОРАЯ ДОЗА: Начать шаг 1 в _____ утра в день процедуры и продолжить, как показано выше:

Для этой дозы повторить шаги с 1 по 4, показанные выше, используя другую 6-унцевую бутылку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо выпить последний стакан воды как минимум 2 часа (или как указано в инструкции) до колоноскопии.

(См. дополнительные указания на следующей странице.)

За день до процедуры...

Что РАЗРЕШАЕТСЯ делать

- Легко позавтракать или принимать ТОЛЬКО прозрачные жидкости; ничего не есть на ужин

НЕЛЬЗЯ пить молоко

- НЕЛЬЗЯ пить молоко
- НЕЛЬЗЯ есть и пить продукты красного или пурпурного цвета
- НЕЛЬЗЯ пить алкогольные напитки

Можно пить следующие виды жидкостей:

- Вода
- Процеженные фруктовые соки (без мякоти), включая яблочный, апельсиновый, сок из белого винограда или белой клюквы
- Лаймад или лимонад
- Кофе или чай (НЕ использовать какие-либо молочные или растительные сливки)
- Куриный бульон
- Десерты из желатина без добавления фруктов и топпинга (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТЫ КРАСНОГО ИЛИ ПУРПУРНОГО ЦВЕТА)

Примечания:

- Набор для подготовки кишечника SUPREP – осмотическое слабительное средство, предназначенное для очищения толстой кишки в качестве подготовки к колоноскопии у взрослых и детей в возрасте от 12 лет
- Обязательно сообщить своему врачу обо всех лекарствах, которые принимаются, включая рецептурные и безрецептурные препараты, витамины и растительные добавки. Набор для подготовки кишечника SUPREP может повлиять на действие других лекарств
- Если лекарство было принято перорально в течение 1 часа перед приемом любой дозы набора для подготовки кишечника SUPREP, то его всасывание может происходить не в полной мере
- В случае приема антибиотиков тетрациклинового или фторхинолонового ряда, препаратов железа, дигоксина, хлорпромазина, пенициллина, его следует осуществлять не менее чем за 2 часа и не менее чем через 6 часов после приема каждой дозы набора для подготовки кишечника SUPREP
- Наиболее распространенными нежелательными реакциями у взрослых (>2 %) после приема набора для подготовки кишечника SUPREP были общий дискомфорт, вздутие живота, боль в животе, тошнота и рвота
- В случае вопросов по приему набора для подготовки кишечника SUPREP следует обращаться к своему врачу

(См. дополнительные указания на следующей странице.)

Необходимо прочитать полную инструкцию по применению препарата и листок-вкладыш, поставляемые в комплекте.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВАША ПРОЦЕДУРА

Время/дата:

Местоположение:

В случае каких-либо вопросов следует обращаться в медицинское учреждение:

Для получения дополнительной информации о данном препарате позвоните по телефону 1-800-874-6756 или посетите веб-сайт www.supreokit.com